

**Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата
ОКТИЛИЯ**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: П N014751/01.

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА: Октилия.

МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ: Тетризолин.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: капли глазные.

СОСТАВ НА 100 МЛ ПРЕПАРАТА:

Активное вещество: тетризолина гидрохлорид - 0,050 г;

Вспомогательные вещества: вода ромашковая 5,0 г; вода липовая 5,0 г; натрия гидрофосфата додекагидрат 2,45 г; калия дигидрофосфат 0,44 г; натрия хлорид 0,150 г; динатрия эдетат 0,010 г; полисорбат-80 0,067 г; бензалкония хлорид 0,005 г; вода очищенная до 100 мл.

ОПИСАНИЕ: прозрачный бесцветный или слегка желтоватого цвета раствор.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: альфа-адреномиметик.

Код АТХ: S01GA02.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакодинамика.

Тетризолина гидрохлорид - альфа-адреномиметик, производное имидазола. Оказывает выраженное сосудосуживающее действие. При местном применении уменьшает отечность и гиперемию слизистых оболочек.

Фармакокинетика.

При местном применении рекомендуемых доз препарат всасывается незначительно. Сведений о степени проникновения в различные ткани глаза после местного применения нет.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Октилия используется в комплексной терапии при лечении заболеваний глаз, сопровождающихся симптомами раздражения, вызванных аллергическими, химическими и физическими факторами (дым, пыль, сильное освещение, отражение света от снежных и водных поверхностей, от излучающих экранов мониторов).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;
- глаукома;
- эпителиально-эндотелиальные дистрофии роговицы;
- детский возраст до 3 лет;
- беременность и период грудного вскармливания.

С осторожностью

- сухой кератоконъюнктивит;
- артериальная гипертензия;
- аритмия, аневризма;
- тяжёлые органические заболевания сердца и сосудов (в том числе ишемическая болезнь сердца);
- гипертриеоз;
- феохромоцитома;
- сахарный диабет;

- период лечения ингибиторами МАО и другими препаратами, повышающими давление, антидепрессантами

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Закапывать по 1-2 капли 2-3 раза в день в конъюнктивальный мешок.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Местные: мидриаз, повышение внутриглазного давления, ощущение жжения в глазу, реактивная конъюнктивальная гиперемия.

Системные эффекты: головная боль, тошнота, сонливость, слабость, трепор, головокружение, бессонница, сердцебиение, тахикардия, гипергликемия, повышение артериального давления, нарушение деятельности сердца, аллергические реакции.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Продолжительное применение глазных капель в чрезмерных дозах может вызвать токсический эффект. Избыточное общее всасывание производных имидазола может привести к угнетению центральной нервной системы, сопровождающемуся сонливостью, гипотермией, брадикардией, коллапсом, апноэ и комой. Риск появления симптомов передозировки, связанных с всасыванием препарата, высок у маленьких детей, особенно при проглатывании.

Симптомы: цианоз, лихорадка, судороги, аритмии, остановка сердца, повышение артериального давления, отек легких, диспноэ.

Лечение: антитот неизвестен. Назначают активированный уголь, промывание желудка, ингаляцию кислорода, жаропонижающие и противоэпилептические средства. Для снижения артериального давления - фентоламин по 5 мг на физиологическом растворе медленно внутривенно или по 100 мг внутрь.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

Препарат не следует применять одновременно с ингибиторами МАО и в течение 10 дней после прекращения их приема.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Без консультации окулиста препарат не следует применять непрерывно более 4-х дней. Если в течение 2-х дней симптомы заболевания сохраняются или становятся более выраженным, необходима консультация окулиста.

Рекомендуется строго соблюдать режим дозирования препарата.

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте, так как при его случайном проглатывании можно спровоцировать системное действие препарата, вызвать седативный эффект.

Пациенты, использующие контактные линзы, могут применять Октилию только при снятых линзах, которые одеваются через 15 минут после закапывания препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА

Капли глазные 0,05 %.

По 8 мл препарата во флакон-капельницу из полиэтилена низкой плотности, укупоренный полистироловым колпачком белого цвета. Один флакон вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ

4 года.

Срок годности препарата после вскрытия флакона - 28 дней.

Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

Владелец (держатель) регистрационного удостоверения

СИФИ С.П.А.

Виа Эрколе Патти, 36, 95025, Ачи Сант-Антонио (КТ), Италия.

Производитель

СИФИ С.П.А.

Виа Эрколе Патти, 36 (пос. Лавинайо), 95025, Ачи Сант-Антонио (КТ), Италия.

В случае необходимости претензии потребителей направлять по адресу

ООО «Бауш Хелс»

Россия, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, помещ. 1Н.

Тел./факс: +7 (495) 510-28-79